

# 台南市立菁寮國中 112 學年度關懷愛滋與去除歧視校園宣導



台南市立菁寮國中 112 學年度關懷愛滋與去除歧視校園宣導



# 台南市立菁寮國中 112 學年度關懷愛滋與去除歧視校園宣導



### 注意 M 痘 Mpxv

你該這樣做

若前往M痘流行地區，避免與不特定人士親密接觸，如有疑似症狀請佩戴口罩並立即就醫。

**症狀好發部位**

臉頰、生殖器、四肢

**可能伴隨症狀**

發燒、畏寒/寒顫、淋巴腺腫大、頭痛

在臉部、四肢、肛門及生殖器附近，出現不同型態的皮膚病灶，如：皮疹、水泡、膿疱

1 皮疹 2 水泡 3 膿疱

### NO AIDS 定期愛滋篩檢 掌握自身健康

## 珍愛自身 有「篩」真好!

**有性行為：**建議至少進行1次篩檢

**有無套性行為：**建議每年至少進行1次篩檢

**有感染風險行為：**建議每3至6個月檢驗1次

感染性病、多性伴伴侶、共用針具並使用成癮性藥物

### 潔身性愛 SAFE 淋病不來 Don't Gonorrhea

傳染途徑及症狀大不同

性行為傳染、傷口接觸患者分泌物、血液、新生兒經由母親感染

**男性症狀：**尿道化膿、排尿刺痛、睪丸疼痛、偶爾可位於直腸感染合併，肛門會有瘙癢感及分泌物流出

**女性症狀：**出現尿道炎、膀胱炎或子宮頸炎的前兆、頻尿、排尿灼痛、或分泌物異味、增加、腹痛

如有懷疑自己感染淋病，勿自行至藥局買藥或誤信偏方。請儘速就醫，早期診斷、早期接受治療!

臺南市政府衛生局 關心您

### 單純1生福 遠離梅毒 Syphilis Out

避免多重性伴侶或與性伴侶不明之對象發生性行為!

**第一期：**梅毒螺旋體侵入人體後2-4週發病。硬性下疳發生於梅毒螺旋體的接觸部位。如：陰莖、女性私密處及口腔

**第二期：**出現全身性下疳的二期梅毒發病。皮膚分佈於手掌與腳掌為二期梅毒之特徵。常侵犯毛囊則會造成局部毛髮脫落。

**第三期：**3-5年後發生晚期梅毒。陰囊與肛門口無痛性扁平濕疣。又稱梅毒瘻；亦可能產生心臟血管性梅毒侵犯主動脈。

梅毒與愛滋病毒感染的傳播途徑類似，利用HIV篩檢以確認是否合併感染。

