

一、流感疫苗接種

112 年度 台南市 市立安定國小校園流感疫苗接種意願書

填寫線上意願書

智慧型手機掃下面QR碼或輸入下面網址至瀏覽器




<https://fluconsensus.cdc.gov.tw/parent/agreement/24077?openExternalBrowser=1>

- ✔ 若完成線上意願書，您可以收到學生接種結果！
- ✔ 需要修改接種意願時，也可以在意願收集截止日期前直接掃QR碼重新填寫
- ✔ 如遇操作問題可至 (<https://youtu.be/aK7e3Nz321w>) 觀看簽署步驟，或洽客服專線02-23959825 分機3201 服務時間為上班日上午 8:30 到 12:30；下午1:30-5:30

線上意願書填寫流程

手機掃QR碼或輸入連結



勾選意願資訊



線上完成簽名



《什麼是流感》

流感是由「流感病毒」所引起的急性呼吸道疾病，與一般感冒不同，通常症狀較明顯，病程也較長。常見的症狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛以及咳嗽等，有時會引起併發症，甚至導致死亡。最常見的併發症是肺炎，其他包括中耳炎、鼻竇炎、腦炎、腦病變、心肌炎、雷氏症候群和其他嚴重的感染症等。

《流感的傳播模式》

流感主要藉由咳嗽、打噴嚏等飛沫將病毒傳染給周圍的人，亦可能經由接觸到受污染物體表面上的流感病毒後，再觸摸自己的口、鼻而感染。罹患流感的人在發病的前1天到發病後的3-7天都可能傳染給別人，幼童的傳播期則更長。

《學生施打流感疫苗的重要性》

根據研究發現，學生較容易被流感病毒侵襲，往往是流行季時最早的發病者，且學生散播的病毒其傳染力較高、傳播時間較長，所以學生是流感病毒的重要傳播者。針對學生接種流感疫苗，不但能有效減少學生感染流感的機率，降低醫療費用的支出，且亦能降低流感病毒的散播，進而間接保護老人、幼兒等高危族群，減少他們因感染而發生嚴重併發症的機率。

《本季流感疫苗成分》

流感疫苗是一種不活化疫苗，政府依世界衛生組織建議採購與國際各國相同之四價流感疫苗，疫苗包含4種不活化病毒成分，即2種A型（H1N1及H3N2）、2種B型。本(111)年度雞胚蛋培養疫苗每劑疫苗之抗原成分為：A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09-like virus；A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus；B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus；B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus。細胞培養疫苗每劑疫苗之抗原成分為A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)pdm09-like virus；A/Darwin/6/2021 (H3N2)-like virus；B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus；B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus。

《接種劑量、間隔與收費方式》

學生每次接種劑量是0.5 mL。另外，未滿9歲兒童，若是初次接種，應接種2劑，2劑間隔4週以上；若過去曾接種過流感疫苗（不論1劑或2劑），今年接種1劑即可。9歲以上則不論過去接種史，都只須接種1劑。由於每年流行的流感病毒不一定相同，因此，符合接種對象者，每年均須重新接種。接種後至少約需2週的時間以產生保護力，其保護效果可持續1年。流感疫苗可以和其他疫苗同時接種在身體不同部位或間隔任何時間接種。本年度提供之疫苗分別由我國國光生物科技股份有限公司、法國Sanofi Pasteur及德國Seqirus等疫苗廠生產製造，3廠牌疫苗的疫苗效力與安全性皆符合我國衛生福利部食品藥物管理署查驗登記規定，且經其核准使用/進口，將依照疫苗到貨順序依序提供。針對學生於學校集中接種，全面提供1劑公費疫苗接種，且無須負擔任何費用，惟倘無法於安排接種日接種者，則需持學校發給之通知單至指定院所接種並自付相關醫療費用。若為出生後首次接種流感疫苗之國小二年級以下學童，如有自覺需要，可於學校第一劑接種至少4週後，至醫療院所自費接種第二劑。

《疫苗保護力》

流感疫苗的保護力因年齡或身體狀況不同而異，平均約可達30-80%，對18歲以上成人因確診流感而住院的保護力約有41%，入住加護病房的流感重症保護力則可達82%。6個月至未滿18歲兒童青少年族群接種流感疫苗之保護力與成人相仿。

《接種禁忌》

- 一、已知對疫苗的成分有過敏者，不予接種。
- 二、過去注射曾經發生嚴重不良反應者，不予接種。

《接種注意事項》

- 一、發燒或正患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種。
- 二、出生未滿6個月，因無使用效益及安全性等臨床資料，故不予接種。
- 三、先前接種本疫苗六週內曾發生Guillain-Barré症候群(GBS)者，宜請醫師評估。
- 四、已知對「蛋」之蛋白質過敏者，可在門/住診由熟悉處理過敏症狀之醫事人員提供接種，並於接種後觀察30分鐘，無不適症狀再離開。
- 五、其他經醫師評估不適合接種者，不予接種。

《青少年常見的暈針反應》

暈針通常是因為對打針的心理壓力與恐懼感，轉化成身體的症狀，出現眩暈與噁心等症狀，大多發生於青少年集體接種疫苗時。大規模疫苗接種時，偶會發生聚集性暈針現象，被稱為集體心因性疾病。暈針反應與疫苗本身安全性無關，也不會造成身體健康的後遺症。建議接種者於接種前避免空腹及脫水情形，等待注射時間不宜過久，可用音樂、影片或聊天等方式放鬆心情，並於接種時採取坐姿。另外，建議於接種後應坐或躺約30分鐘，以避免因發生昏厥而摔倒受傷。倘若發生暈針狀況，建議先至休息區休息，採坐姿或平躺姿勢緩解其緊張情緒，同時通知醫護人員（在學校應通知學校老師及醫護人員）。如暈針現象持續，宜送醫診治。

《安全性及副作用》

流感疫苗是由死病毒製成的不活化疫苗，因此不會因為接種流感疫苗而得到流感。接種後可能有注射部位疼痛、紅腫，少數的人會有全身性的輕微反應，如發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚瘙癢、蕁麻疹或紅疹等，一般會在發生後1至2天內自然恢復。和其他任何藥品一樣，雖然極少發生，但流感疫苗也有可能造成嚴重的副作用，如立即型過敏反應，甚至過敏性休克等不適情況（臨床表現包括呼吸困難、聲音沙啞、氣喘、眼睛或嘴唇腫脹、頭昏、心跳加速等），若不幸發生，通常於接種後幾分鐘至幾小時內即出現症狀。其他曾被零星報告過之不良事件包括神經系統症狀（如：臂神經叢炎、顏面神經麻痺、熱痙攣、腦脊髓炎、對稱性神經麻痺為表現的Guillain-Barré症候群等）和血液系統症狀（如：暫時性血小板低下，臨床表現包括皮膚出現紫斑或出血點、出血時不易止血等）。除了1976年豬流感疫苗、2009年H1N1新型流感疫苗與部分季節性流感疫苗經流行病學研究證實與Guillain-Barré症候群可能相關外，其他少有確切統計數據證明與接種流感疫苗有關。此外，現有研究結果與世界衛生組織報告均顯示，孕婦於懷孕期間接種不活化流感疫苗，並未增加妊娠及胎兒不良事件之風險。本年度採購之流感疫苗皆不含硫柳汞成分。

112年度校園流感疫苗接種意願書
學校：台南市市立安定國小



掃描QR碼以填寫學生接種意願

LINE 群組文字呈現

各位家長您好：

有關112年校園流感疫苗接種流程，衛福部疾病管制署為了大幅降低紙本印製需求及人工作業流程，將傳統紙本簽署意願改成『**CIVS線上簽署**』，線上簽署接種意願書步驟如下圖。



以下↓是安定國小校園流感疫苗接種線上意願書簽署

112年度台南市安定國小校園流感疫苗接種意願書 填寫線上意願書(有2種方式-請選擇其中1項填寫)

1、智慧型手機掃下面QR碼 或

112年度校園流感疫苗接種意願書
學校：台南市市立安定國小



掃描QR碼以填寫學生接種意願

2、點選下面網址至瀏覽器

<https://fluconsensus.cdc.gov.tw/parent/agreement/24077?openExternalBrowser=1>

親愛的家長，您好：	親愛的家長，您好：
校園流感疫苗接種~112年起啟用流感電子化系統(CIVS)	校園流感疫苗接種~112年起啟用流感電子化系統(CIVS)
1請家長用手機掃描QR code連結意願書，即可完成簽署作業（請務必以正楷筆畫完成簽名）	1請家長用手機掃描QR code連結意願書，即可完成簽署作業（請務必以正楷筆畫完成簽名）
2、不論您是否有意願讓您的孩子接種流感疫苗，都必須於 9/29(五)12:00前 完成線上簽署作業。	2、不論您是否有意願讓您的孩子接種流感疫苗，都必須於 9/29(五)12:00前 完成線上簽署作業。
3、疫苗施打前都可以進行意願修改。	3、疫苗施打前都可以進行意願修改。
4、本校預計於 10/20(五) 進行校園流感疫苗接種。	4、本校預計於 10/20(五) 進行校園流感疫苗接種。
5、表單填寫方式及流程：已放置安定國小網頁及班級老師會統一傳至各班級的line群組上。	5、表單填寫方式及流程：已放置安定國小網頁及班級老師會統一傳至各班級的line群組上。
安定國小學務處暨健康中心 邀請您一同關心孩子健康！	安定國小學務處暨健康中心 邀請您一同關心孩子健康！
親愛的家長，您好：	親愛的家長，您好：
校園流感疫苗接種~112年起啟用流感電子化系統(CIVS)	校園流感疫苗接種~112年起啟用流感電子化系統(CIVS)
1請家長用手機掃描QR code連結意願書，即可完成簽署作業（請務必以正楷筆畫完成簽名）	1請家長用手機掃描QR code連結意願書，即可完成簽署作業（請務必以正楷筆畫完成簽名）
2、不論您是否有意願讓您的孩子接種流感疫苗，都必須於 9/29(五)12:00前 完成線上簽署作業。	2、不論您是否有意願讓您的孩子接種流感疫苗，都必須於 9/29(五)12:00前 完成線上簽署作業。
3、疫苗施打前都可以進行意願修改。	3、疫苗施打前都可以進行意願修改。
4、本校預計於 10/20(五) 進行校園流感疫苗接種。	4、本校預計於 10/20(五) 進行校園流感疫苗接種。
5、表單填寫方式及流程：已放置安定國小網頁及班級老師會統一傳至各班級的line群組上。	5、表單填寫方式及流程：已放置安定國小網頁及班級老師會統一傳至各班級的line群組上。
安定國小學務處暨健康中心 邀請您一同關心孩子健康！	安定國小學務處暨健康中心 邀請您一同關心孩子健康！

112年度 台南市校園流感疫苗補種通知單 (補發 第1次)

學校：市立安定國小

學制：-

日夜別：-

科系：

年級班級：1 年 1 班

座號：1 號

姓名：林榆泓

性別：男



學校戳章處

貴子女於 112 年 10 月 20 日因發燒或其他原因，未能於學校完成流感疫苗接種

為了學童健康及權益，請於 年 月 日前持此通知單，自行至 衛生所或合約院所接種，需自付部分相關費用，並建議前往接種前先聯繫指定合約院所確認尚有疫苗再前往接種。流感疫苗之接種或相關防治措施，請參閱疾病管制署網站 (<http://www.cdc.gov.tw>)。

《疫苗保護力》

流感疫苗的保護力因年齡或身體狀況不同而異，平均約可達30-80%，對18歲以上成人因確診流感而住院的保護力約有41%，入住加護病房的流感重症保護力則可達82%。6個月至未滿18歲兒童青少年族群接種流感疫苗之保護力與成人相仿。由於每年流行的流感病毒型別不一定相同，因此每年均須重新接種。本(112)年度雞胚胎蛋培養疫苗每劑疫苗之抗原成分為：A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus；A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus；B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus；B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus。細胞培養疫苗每劑疫苗之抗原成分為A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09-like virus；A/Darwin/6/2021 (H3N2)-like virus；B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus；B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus。其保護效力與國際各國狀況相同。接種後至少約需 2 週的時間以產生保護力，其保護效果可持續 1 年。完成疫苗接種後，雖可有效降低感染流感病毒的機率，但仍可能罹患其他病毒所引起的呼吸道感染，請注意個人衛生保健及各種預防措施，維護身體健康。

《安全性及副作用》

流感疫苗是由死病毒製成的不活化疫苗，因此不會因為接種流感疫苗而得到流感。接種後可能有注射部位疼痛、紅腫，少數的人會有全身性的輕微反應，如發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚瘙癢、荨麻疹或紅疹等，一般會在發生後 1 至 2 天內自然恢復。和其他任何藥品一樣，雖然極少發生，但流感疫苗也有可能造成嚴重的副作用，如立即型過敏反應，甚至過敏性休克等不適情況 (臨床表現包括呼吸困難、聲音沙啞、氣喘、眼睛或嘴脣腫脹、頭暈、心跳加速等)，若不幸發生，通常於接種後幾分鐘至幾小時內即出現症狀。其他曾被零星報告過之不良事件包括神經系統症狀 (如：臂神經叢炎、顏面神經麻痺、熱痙攣、腦脊髓炎、對稱性神經麻痺為表現的 Guillain-Barré 症候群等) 和血液系統症狀 (如：暫時性血小板低下，臨床表現包括皮膚出現紫斑或出血點、出血時不易止血等)。除了 1976 年豬流感疫苗、2009 年 H1N1 新型流感疫苗與部分季節性流感疫苗經流行病學研究證實與 Guillain-Barré 症候群可能相關外，其他少有確切統計數據證明與接種流感疫苗有關。此外，現有研究結果與世界衛生組織報告均顯示，孕婦於懷孕期間接種不活化流感疫苗，並未增加妊娠及胎兒不良事件之風險。目前研究發現，雞蛋過敏者接種雞胚胎製程之流感疫苗並不會影響過敏反應發生率，國際上皆建議雞蛋過敏者可安心接種流感疫苗。

《接種注意事項》

- 一、發燒或正患有急性中重症疾病者，宜待病情穩定後再接種。
- 二、出生未滿6個月，因無使用效益及安全性等臨床資料，故不予接種。
- 三、先前接種本疫苗六週內曾發生Guillain-Barré症候群(GBS)者，宜請醫師評估。
- 四、其他經醫師評估不適合接種者，不予接種。

《接種禁忌》

- 一、已知對疫苗的成分有過敏者，不予接種。
- 二、過去注射曾經發生嚴重不良反應者，不予接種。

《接種後注意事項》

- 一、流感疫苗是一種相當安全的不活化疫苗，接種後可能有注射部位疼痛、紅腫，少數的人會有全身性的輕微反應，如發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚瘙癢、荨麻疹或紅疹等，但一般均於接種後一到二天內恢復，嚴重的副作用則極少發生。
- 二、接種流感疫苗後48小時內約有1-2%可能有發燒反應，應告知醫師曾經接種過流感疫苗以作為鑑別診斷的參考。接種48小時後仍然持續發燒時，應考慮可能另有其他感染或發燒原因。
- 三、接種後如有持續發燒、意識或行為改變、呼吸困難、心跳加速等不適症狀，應儘速就醫，並通報學校班導師/護理人員、當地衛生局或疾病管制署。
- 四、暈針通常是因為對打針的心理壓力與恐懼感，轉化成身體的症狀，出現眩暈與噁心等症狀，大多發生於青少年集體接種疫苗時。大規模疫苗接種時，偶會發生聚集性暈針現象，被稱為集體心因性疾病。暈針反應與疫苗本身安全性無關，也不會造成身體健康的後遺症。倘若學生於回家後暈針現象持續，宜送醫診治。
- 五、完成疫苗接種後，雖可降低感染流感的機率，但仍有可能罹患其他非流感病毒所引起的呼吸道感染，請注重個人衛生保健及各種預防措施，以維護身體健康。
- 六、使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。
- 七、貴子女如為出生後首次接種流感疫苗之國小二年級以下學童，如有自覺需要，可於第一劑接種至少四週後，至醫療院所自費接種第二劑。

*請合約院所於完成補接種後，將學生接種情形上傳至全國性預防接種資訊系統(NIIS)

流感疫苗接種照片



二、XBB 疫苗施打



臺南市安定區安定國民小學

2月27日 · 🌐

113.02.27 XBB疫苗接種

感謝安定區衛生所入校幫師生們接種莫德納XBB疫苗；也感謝本校志工團志工到場為師生服務。



XBB 疫苗施打照片



三、與新興醫院合作進行一、四年級學生健康檢查



四、與安定牙醫診所合作進行一、二年級窩溝封填

